

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 18-8-69 95577

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIÈGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE) (Tél. 86-31-55 et 86-32-55)

PROTECTION DES VEGETAUX - Rue St-Jean prolongée
B. P. n° 20 — 31 - BALMA

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne
Rue St-Jean prolongée - BALMA
C. C. P. 8612-11 TOULOUSE

- Supplément N° 1 au Bulletin technique N° 107 d'Août 1969 -

1969-21

- AVERTISSEMENTS -

VIGNE

- Mildiou : Afin de protéger le feuillage, dont la croissance se poursuit encore, il est conseillé de mettre en place un nouveau traitement en utilisant de préférence un produit à longue persistance d'action.
- Black-rot : Dans les foyers, poursuivre la protection, les attaques sur grappes étant susceptibles de se poursuivre au-delà de la véraison.

ARBRES FRUITIERS

- Carpocapse des pommes et des poires :
Le deuxième vol s'intensifie et la ponte journalière est importante. Cependant, le dernier traitement, placé après les gros orages des 1er et 5 août, assure encore une bonne protection.
- Tordeuse orientale du pêcher :
Dans les vergers tardifs, où la cueillette des dernières variétés ne commencera pas avant le 25 août, on peut encore appliquer dès réception un produit à base de Mévinphos à raison de 50 g de matière active à l'hectolitre. Nous rappelons que l'emploi de ce produit est interdit moins de 7 jours avant la récolte.

GRANDES CULTURES

- Mildiou de la pomme de terre : (Tous départements y compris l'Aveyron)
Les pluies de la fin juillet n'ont pratiquement pas provoqué de repiquages (absence de fructifications sur les taches) mais elles ont permis une reprise d'activité du champignon et l'émission de nouveaux germes.
En conséquence, il est recommandé d'effectuer un nouveau traitement.
Si l'on constate la présence de Doryphores, ajouter un insecticide.

- INFORMATIONS -

VIGNE

- Pourriture grise des raisins : (Botrytis cinerea)
Les pluies orageuses de la fin du mois de juillet et du début d'août ont amené un développement parfois sérieux de botrytis sur certains cépages sensibles (Meuzac blanc, Sémillon, Chalosse, Folle blanche par exemple).
Dans les vignes sujettes au botrytis, il serait intéressant de choisir, pour combattre le Mildiou, l'un des produits également actif contre la Pourriture grise : Dichlofluanide, Captafol (raisin de table), Captane, Phaltane.

P.1.188

- Oïdium : Effectuer un traitement, par poudrage de préférence, pour éviter le développement du champignon sur les grappes.

- Araignées jaunes :

Surveiller les vignes où cet acarien est installé et appliquer un acaricide d'été si ces animaux manifestent un regain d'activité. L'envahissement d'une vigne est rarement homogène et complet. Repérer soigneusement les foyers et n'intervenir que localement pour éviter, dans la mesure du possible, la destruction d'auxiliaires précieux pour l'avenir.

CULTURES LEGUMIERES

- Melon : Effectuer, dès la première menace de pluie, un traitement mixte destiné à combattre l'Anthracnose et l'Oïdium.

- Tomate : Contre le Mildiou et l'Alternaria, appliquer un nouveau traitement.

- Teigne du poireau :

Effectuer une nouvelle application avec l'un des produits cités dans le bulletin du 24 juillet.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

J. BESSON - E. JOLY

BALMA, le 12 Août 1969
L'Inspecteur de la Protection des
Végétaux,

L. IMBERT

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de "MIDI-PYRENEES".

Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.